



## Avant l'intervention

- **Vider les placards** (surtout bas) et le dessous d'évier ; ranger la vaisselle et les aliments dans des **bacs hermétiques**.
- **Dégager les accès** : plinthes, tuyaux, siphons, arrière/latéraux du frigo, four, lave-vaisselle ; retirer les **socles** démontables si possible.
- **Nettoyer la graisse** visible (hottes/parois) sans dégraisser les zones susceptibles de recevoir du **gel appât**.
- Sortir les **poubelles**, poser un sac propre, éliminer miettes et eaux stagnantes ; **réparer les fuites** d'eau.
- **Sécuriser** enfants/animaux ; signaler allergies/asthme ; préparer la clé si accès autonome.

## Pendant l'intervention

- Laisser le technicien réaliser le **diagnostic** (espèce, foyers) et l'application des **gels / pulvérisations ciblées**.
- Ne pas toucher ni déplacer les **points de gel**.
- Respecter une éventuelle **évacuation temporaire** selon la méthode utilisée.

## Après l'intervention

- **Aérer** si indiqué et respecter le **délai de retour** (souvent 2–4 h).
- Ne pas **laver** immédiatement les zones traitées (laisser agir le produit, souvent 3–7 jours).
- Maintenir une **hygiène stricte** : essuyer l'eau, sortir les poubelles, éviter miettes ; passer l'aspirateur sans insister sur le gel.
- **Suivi** : une hausse temporaire d'activité peut apparaître, puis décroître ; attendre le passage de contrôle si prévu.
- **Colmater** les interstices (mastic), poser joints/balais de porte et grilles à maille fine dans les pièces sensibles.

*Note : en cas d'asthme, grossesse ou animaux sensibles, demandez les consignes spécifiques au technicien.*